

CD31 (JC70) Mouse Monoclonal Antibody

K použití v diagnostice in vitro (IVD)

Identifikace produktu

| REF | Popis |
|---------|--|
| 131M-94 | 0,1 ml koncentrát |
| 131M-95 | 0,5 ml koncentrát |
| 131M-96 | 1,0 ml koncentrát |
| 131M-97 | 1,0 ml předředěný připravený k použití |
| 131M-98 | 7,0 ml předředěný připravený k použití |

Definice symbolů

| | |
|----------|---------------------------|
| KEY-CODE | kód |
| P | předředěný přípravek |
| C | koncentrát |
| A | ascites |
| E | sérum |
| S | supernatant |
| DIL | rozsah ředění koncentrátu |

Určené použití

Tato protilátku je určena pro diagnostiku *in vitro* (IVD).

Protilátku CD31 (JC70) Mouse Monoclonal Primary Antibody slouží k laboratorní detekci proteinu CD31 v preparátech tkání fixovaných formalínem a zalitých v parafínu, barvených pomocí imunohistochemie (IHC) pro kvalitativní hodnocení.

Výsledky použití tohoto produktu musí být interpretovány kvalifikovaným patologem ve spojení s relevantní klinickou anamnézou pacienta, dalšími diagnostickými testy a příslušnými kontrolami.

Souhrn a vysvětlení

CD31 je exprimován v cytoplazmě i na membránách zdravých a neoplastických endoteliálních buněk cév.¹ Využívá se jako nástroj k identifikaci cévního původu neoplazí, například u angiosarkomů, Kaposiho sarkomů a hemangioendoteliomů.^{1,2} Rovněž bylo prokázáno, že imunohistochemické studie využívající CD31 jsou užitečné při detekci oblastí lymfovaskulární nádorové invaze.³ U CD31 byla navíc prokázána slabá difúzní cytoplazmatická imunoreaktivita

v případech nejrůznějších karcinomů, a to s přiležitostným barvením na membráně u duktálních karcinomů prsu stejně jako u intratumorálních makrofágů.^{4,5}

Principy a postupy

Uvedená primární protilátku se používá jako primární protilátku při imunohistochemickém barvení tkáňových řezů fixovaných formalínem a zalitých v parafínu. Imunohistochemické barvení ve spojení s detekčním systémem s navázanou křenovou peroxidázou a alkalickou fosfatázou obecně umožňuje vizualizaci antigenů prostřednictvím sekvenční aplikace konkrétní protilátky (primární protilátku) proti antigenu, sekundární protilátky (spojovací protilátku) proti primární protilátkce, komplexu enzymu a chromogenního substrátu, která je proložena promývacími kroky. Enzymatická aktivace chromogenu vede k viditelnému reakčnímu produktu v místě antigenu. Vzorek pak může být kontrastně obarven a zakryt krycím sklíčkem. Výsledky se interpretují pomocí světelného mikroskopu.

Materiály a metody

Dodávaná činidla

| Složení výrobku | |
|---------------------------------------|--|
| Předředěný přípravek: naředěn v | Tlumivém roztoku Tris, pH 7,3 – 7,7, s 1% BSA a < 0,1% azidem sodným |
| Koncentrát: naředěn v | Tlumivém roztoku Tris, pH 7,3 – 7,7, s 1% BSA a < 0,1% azidem sodným |
| Hostitel | Myší |
| Izotyp | IgG ₁ /k |
| Doporučovaný rozsah pracovního ředění | 1:25–1:100 |
| Zdroj | supernatant |

Štítek výrobku obsahuje následující informace o šarži:

- Koncentraci imunoglobulinu v protilátkce
- Podrobnosti o zdroji

Rekonstituce, smísení, ředění nebo titrace

Předředěná protilátku je připravena k použití a optimalizována k barvení. Není vyžadována rekonstituce, smísení, ředění nebo titrace. Koncentrovaná protilátku je optimalizována pro ředění v rozsahu ředění pomocí ředidle Cell Marque Diamond: Antibody Diluent.

Potřebné nedodávané materiály a činidla

Následující činidla a materiály mohou být potřebné pro barvení, ale nejsou dodány současně s primární protilátkou:

- Pozitivní a negativní kontrolní vzorek tkání
- Mikroskopická sklíčka, s pozitivním nábojem
- Sušící pec schopná udržovat teplotu 53 – 65 °C

4. Barvicí misky nebo lázně
 5. Stopky
 6. Xylen nebo substituty xylenu
 7. Etanol nebo jiný alkohol
- Poznámka: Jednostupňové přípravné činidlo Cell Marque, Trilogy™ (kat. č. 920P-06), může nahradit kroky 6 a 7 výše.
8. Deionizovaná nebo destilovaná voda
 9. Zahřívací aparatura, např. elektrický tlakový vařič pro předběžné zpracování tkáně
 10. Detekční systém, např. HiDef Detection™ HRP Polymer System (kat. č. 954D-20) nebo HiDef Detection™ Alk Phos Polymer System (kat. č. 962D-20)
 11. Chromogen, např. DAB Substrate Kit (kat. č. 957D-20) nebo Permanent Red Chromogen Kit (kat. č. 960D-10)
 12. TBS IHC Wash Buffer + Tween®* 20 (kat. č. 935B-09)
 13. Hematoxylin nebo jiné doplňkové barvivo
 14. Ředitla protilátek, např. Diamond: Antibody Diluent (kat. č. 938B-05) nebo Emerald: Antibody Diluent (kat. č. 936B-08)
 15. Peroxide Block (kat. č. 925B-05) pro použití s HRP
 16. Avidin-Biotin Blocking Reagents pro použití s detekcí streptavidin-biotin
 17. Negativní Kontrolní Činidlo (kat. č. 939B-02 pro univerzální)
 18. Mounting Medium
 19. Krycí sklíčko
 20. Světelný mikroskop (40-400x)

Skladování a zacházení

Skladujte při 2 - 8 °C. Nezmrazujte.

Aby byl zajistěn správný výkon činidla a stabilita protilátky, musí se lahvička po každém použití uzavřít víckem a okamžitě umístit ve vertikální poloze do chladničky.

Každé činidlo s protilátkou má stanovenou dobu expirace. Je-li rádně skladováno, je činidlo stabilní do data uvedeného na štítku. Nepoužívejte činidla po uplynutí expirační doby pro předepsanou metodu skladování.

Tento produkt nejeví žádné známky indikující nestabilitu, proto by se současně s testováním neznámých vzorků měly provádět testy s pozitivními i negativními kontrolními vzorky. V případě podezřelých známek nestability činidla se obratte na technickou podporu společnosti Cell Marque.

Sběr vzorků a příprava pro analýzu

Pro použití této primární protilátky s detekčními soupravami Cell Marque (viz Potřebné materiály a činidla, která se nedodávají) jsou vhodné tkáně zpracované běžným způsobem, fixované v neutrálním pufovaném formalíně a zalité v parafínu. Poznámka: Společnost Cell Marque hodnotí výsledky pouze na lidských tkáních. Doporučené vhodné fixativum je 10% neutrální pufovaný formalín. V důsledku delší fixace nebo speciálních procesů, jako např. dekalcifikace preparátů kostní dřeně, mohou být získány variabilní výsledky.

Každý řez je třeba nařezat na správnou tloušťku (asi 3 µm) a umístit na pozitivně nabité podložní sklíčko. Sklíčka obsahující řezy tkání je třeba sušit po dobu nejméně 2 hodin (avšak ne déle než 24 hodin) při teplotě 53 až 65 °C.

Upozornění a bezpečnostní předpisy

1. Při zacházení s činidly budte opatrní. Používejte jednorázové rukavice a laboratorní pláště při manipulaci s podezřelými karcinogenními nebo jedovatými materiály (například: xylen).
2. Vyuvarujte se kontaktu činidel s očima nebo sliznicemi. Jestliže se činidla dostanou do kontaktu s citlivými oblastmi, omyjte je vydatným množstvím vody.
3. Se vzorky pacientů a všemi materiály, které s nimi přišly do styku, je třeba zacházet jako s biologicky nebezpečnými materiály a zneškodňovat je podle správných opatření. Nikdy nepipetejte ústy.
4. Vyuvarujte se mikrobiologické kontaminaci činidel, protože by to mohlo způsobit nesprávné výsledky.
5. Uživatel musí validovat inkubační doby a teploty.
6. Předředěná činidla připravená k použití jsou optimálně zředěna a další ředění může vést ke ztrátě barvení antigenu.
7. Koncentrovaná činidla mohou být optimálně zředěna po ověření uživatelem. Jakékoli použité ředitel činidla, které není výslovně doporučeno v tomto dokumentu, musí být uživatelem validováno, aby se ověřila jeho kompatibilita a vliv na stabilitu.
8. Při použití v souladu s pokyny není tento přípravek klasifikován jako nebezpečná látka. Konzervační látka v činidle je azid sodný s koncentrací nižší než 0,1 %, který při uvedené koncentraci nenaplňuje kritéria OSHA (USA) pro nebezpečnou látku. Viz bezpečnostní list.
9. Uživatel musí ověřit jakékoli skladovací podmínky, které jsou jiné, než je uvedeno v příbalovém letáku.
10. Ředitel roztok může obsahovat bovinní sérový albumin a supernatant může obsahovat bovinní sérum. Přípravky obsahující fetální bovinní sérum a přípravky obsahující bovinní sérový albumin jsou kupovány od komerčních dodavatelů. Certifikáty původu pro zvěřecí zdroje použité v těchto přípravcích jsou uloženy ve společnosti Cell Marque. Tyto certifikáty dokládají, že zdroj boviných přípravků je ze zemí se zanedbatelným rizikem BSE a uvádějí zdroje boviných přípravků z USA a Kanady.
11. Stejně jako v případě jiných produktů odvozených z biologických zdrojů je třeba používat správné postupy zacházení.

Návod k použití

Doporučené barvicí protokoly pro uvedenou primární protilátku:

HiDef HRP:

HiDef Detection™ HRP Polymer System (kat. č. 954D-20)

1. Technika zpřístupnění epitopu: HIER, Reagencie pro zpřístupnění epitopu: Trilogy
2. Inkubační doba Protilátky (minuty): 10-30
3. Inkubační doba HiDef Detection Amplifier (minuty): 10
4. Inkubační doba HiDef Detection Polymer Detector (minuty): 10
5. Inkubační doba DAB (minuty): 1-10
6. Dehydratujte a zakryjte sklíček.

HiDef Alk Phos:

HiDef Detection™ Alk Phos Polymer System (kat. č. 962D-20)

1. Technika zpřístupnění epitopu: HIER, Reagencie pro zpřístupnění epitopu: Trilogy

2. Inkubační doba Protilátka (minuty): 10-30
3. Inkubační doba HiDef Detection Amplifier (minuty): 10
4. Inkubační doba HiDef Detection Polymer Detector (minuty): 10
5. Inkubační doba Permanent Red (minuty): 15-30
6. Dehydratujte a zakryjte skličkem.

Postupy kontroly kvality

Positivní kontrolní vzorek tkáně

Při každém provedeném barvícím postupu je třeba použít i pozitivní kontrolní vzorek tkáně. Tkáň může obsahovat pozitivní i negativně zbarvené buňky nebo části tkáně a slouží jako pozitivní i negativní kontrolní vzorek tkáně. Kontrolní vzorky by měly být čerstvé vzorky z pitvy, biopsie nebo operace připravené nebo fixované co nejdříve a zálité stejným způsobem jako testované řezy. Použití tkáňového řezu fixovaného nebo zpracovaného jiným způsobem než testovaný vzorek zajistí kontrolu pro všechna činidla a kroky metody kromě fixace a zpracování tkáně.

Tkáň se slabým pozitivním zbarvením je pro optimální kontrolu kvality a pro detekci i malé degradace činidla vhodnější. Pozitivní tkáňová kontrola pro uvedenou primární protilátku může zahrnovat následující:

| Positivní kontrolní vzorek tkáně | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Tkáň | Vizualizace |
| Mandle | Cytoplasmatické, Membránové |

Známé pozitivní kontrolní vzorky tkáně by měly být používány pouze ke sledování správné funkce zpracovaných tkání a testových činidel, nikoliv jako pomůcka k formulaci specifické diagnózy vzorků pacientů. Pokud se u pozitivních kontrolních vzorků tkání neprojeví odpovídající pozitivní zbarvení, je nutno považovat výsledky testovacích vzorků za neplatné.

Negativní kontrolní vzorek tkáně

Jako negativní kontrolní vzorek tkáně lze použít stejnou tkáň, která se používá jako pozitivní kontrolní vzorek. Rozmanitost různých typů buněk, které se nacházejí ve většině řezů tkání, nabízí oblasti pro negativní kontrolní vzorky, ale to by mělo ověřit uživatel. Části, které se nebarví, by měly prokázat nepřítomnost specifického zbarvení a zajistit indikaci nespecifického zbarvení pozadí. Pokud se projeví specifické zbarvení v částech negativního kontrolního vzorku tkání, je nutno považovat výsledky vzorků pacienta za neplatné.

Nevysvětlené rozdíly

Nevysvětlitelné rozporu v kontrolních vzorkách by měly být ihned ohlášeny technické podpoře společnosti Cell Marque. Pokud se výsledky kontrol neshodují se specifikacemi, výsledky pacienta jsou neplatné. Viz část Řešení problémů v tomto letáku. Zjistěte a napravte problém, a pak zopakujte celý postup se vzorky pacienta.

Negativní kontrolní činidlo

K usnadnění interpretace výsledků je třeba provést pro každý vzorek cyklus s negativní kontrolním činidlem. Negativní kontrolní činidlo se používá místo primární protilátky, aby se dalo vyhodnotit nespecifické zbarvení. Krycí skličko by mělo být ošetřeno negativním kontrolním činidlem, které odpovídá druhu hostitele primární protilátky a ideálně má stejnou IgG koncentraci. Inkubační doba negativního kontrolního činidla by měla odpovídat inkubační době primární protilátky.

Interpretace výsledků

Proces imunobarvení způsobuje zbarvený reakční produkt, který se vysráží v oblastech antigenů lokalizovaných primární protilátkou. V příbalovém letáku k příslušnému detekčnímu systému najdete očekávané reakční barvy. Před interpretací výsledků musí pozitivní a negativní kontrolní vzorky vyhodnotit kvalifikovaný patolog se zkušeností s imunohistochemií.

Pozitivní kontrolní vzorek tkáně

Nejprve je nutné provést test zabarveného pozitivního kontrolního vzorku tkáně, a ověřit tak správnost funkce všech reagencí. Přítomnost správně zbarveného reakčního produktu uvnitř cílových buněk indikuje pozitivní reaktivitu. V příbalovém letáku k detekčnímu systému najdete očekávané reakční barvy. V závislosti na délce inkubační doby a potenci použitého hematoxylinu způsobí kontrastní barvení bleděmodré až tmavomodré zbarvení buněčných jader. Prílišné nebo neúplné kontrastní zbarvení může ohrozit správnou interpretaci výsledků. Pokud se u pozitivních kontrolních tkání neprojeví příslušné pozitivní zbarvení, je nutno považovat výsledky testovaných vzorků za neplatné.

Negativní kontrolní vzorek tkáně

Negativní kontrolní vzorek tkáně je nutno testovat po pozitivním kontrolním vzorku, abychom ověřili specifitu značení cílového antigenu primární protilátkou. Nepřítomnost specifického zbarvení v negativním kontrolním vzorku potvrzuje nepřítomnost zkřížené reaktivity s buňkami nebo částmi buněk. Pokud se projeví specifické zbarvení v negativním kontrolním vzorku tkáně, je nutno považovat výsledky vzorků pacienta za neplatné. Pokud se vyskytuje nespecifické zbarvení, je většinou difúzní. Sporadicke slabé zbarvení pojivové tkáně lze také pozorovat v řezech z tkání, které nejsou optimálně fixované. K interpretaci výsledků barvení používejte pouze intaktní buňky. Nekrotické nebo degenerované buňky vykazují nespecifické zbarvení.

Tkáň pacienta

Vzorky pacienta se vyšetřují jako poslední. Intenzitu pozitivního zbarvení je nutno posuzovat v kontextu jakéhokoli zbarvení pozadí negativního kontrolního činidla. Jako u každého imunohistochemického testu, negativní výsledek znamená, že antigen nebyl detekován, nikoli že antigen není v testovaných buňkách nebo tkáni přítomen. Při identifikaci falešných negativních reakcí může pomoci panel protilátek (viz část Souhrn očekávaných výsledků). Ke správné interpretaci každého imunohistochemického výsledku by měla být testována rovněž morfologie každého vzorku tkání s využitím řezů barvených hematoxylinem a eozinem. Morfologické nálezy pacientů a klinické údaje týkající se pacientů musí interpretovat kvalifikovaný patolog.

Omezení

1. Protilátká barva nemá vliv na výkonnost
2. Toto činidlo je určeno pouze pro „odborné použití“, protože imunohistochemie je několikakrokový proces, který vyžaduje speciální školení při výběru vhodných činidel, tkání, fixace a zpracování, přípravě imunohistochemického sklička a interpretaci výsledků barvení.
3. Pouze pro laboratorní užití.
4. Pro diagnostiku *in vitro*.
5. Barvení tkáně závisí na zacházení a zpracování tkáně před barvením. Nesprávná fixace, zmražení, rozmrážení, umývání, sušení, zahřívání, řezání nebo kontaminace jinými tkáněmi nebo tekutinami může vést ke vzniku artefaktů, zachycení protilátky nebo falešně negativním výsledkům. Následkem odchylek při fixaci a metodách

zalévání, ale i následkem stávajících nerovnoměrností ve tkáni může docházet k inkonzistentním výsledkům.

6. Přílišné nebo neúplné kontrastní zbarvení může ohrozit správnou interpretaci výsledků.
7. Klinická interpretace jakéhokoli pozitivního zbarvení nebo jeho nepřítomnosti musí být posouzena v kontextu klinické anamnésy, morfologie, dalších histopatologických kritérií a rovněž dalších diagnostických testů. Tato protilátká je určena k použití v panelu protilaterek. Je odpovědností kvalifikovaného patologa, aby se seznamil s protilaterkami, činidly a metodami používanými k barvení preparátů. Barvení se musí provádět v certifikované laboratoři s příslušným oprávněním a pod dohledem patologa zodpovědného za hodnocení barvených podložních skel a zaručení adekvátnosti pozitivních a negativních kontrolních vzorků.
8. Společnost Cell Marque poskytuje protilaterky a činidla v optimálním ředění pro použití podle pokynů. Jakákoliv odchylka od doporučených testovacích postupů může způsobit neočekávané výsledky. Je nutno používat a zdokumentovat příslušné kontrolní vzorky. Uživatelé musejí za všechn okolnosti přijmout zodpovědnost za interpretaci výsledků pacienta.
9. Společnost Cell Marque poskytuje primární protilaterky v koncentrované formě, takže je může uživatel následně optimálně zředit pro použití podle určení uživatele a při dodržení vhodných technik validace. Uživatel musí provést validaci při použití jakýchkoli ředicích roztoků jiných, než zde uvedených. Když je primární činidlo validováno jako vhodné, může jakákoliv odchylka od doporučených testovacích postupů způsobit neočekávané výsledky. Je nutno používat a zdokumentovat příslušné kontrolní vzorky. Uživatelé musejí za všechn okolnosti přijmout zodpovědnost za interpretaci výsledků pacienta.
10. Tento přípravek není určen pro průtokovou cytometrii.
11. Činidla mohou prokázat neočekávané reakce na dříve netestovaných tkání. V důsledku biologické variability exprese antiguenu v novotvarech nebo jiných patologických tkání nelze zcela vyloučit možnost neočekávaných reakcí i v testovaných skupinách tkání. S podezřelými zdokumentovanými neočekávanými reakcemi se obratte na technickou podporu společnosti Cell Marque.
12. Tkáň od osob infikovaných virem hepatitidy B a obsahující povrchový antigen hepatitidy B (HBsAg) mohou vykazovat nespecifické barvení křenové peroxidázy.
13. Při použití v krocích blokování mohou normální séra ze stejněho zvířecího zdroje jako sekundární protilaterky způsobit falešně negativní nebo falešně pozitivní výsledky vzhledem k účinku autoimunitních protilaterek nebo přirozených protilaterek.
14. Je možné pozorovat falešně pozitivní výsledky v důsledku neimunologické vazby bílkovin nebo reakčních produktů substrátu. Mohou být také způsobeny aktivitou pseudoperoxidázy (erytrocyty) a endogenní peroxidázy (cytochrome C) nebo endogenním biotinem (příklad: játra, mozek, prs, ledvina), v závislosti na použitém typu imunobarvení.
15. Stejně jako u každého imunohistochemického testu, znamená negativní výsledek, že antigen nebyl zjištěn, nikoli, že antigen není přítomný ve vyšetřovaných buňkách nebo tkáni.
16. Předěděný přípravky s protilaterkami jsou optimalizované jako připravené k použití. Vzhledem k možnosti různých způsobů fixace a zpracování tkání může být potřeba pro jednotlivé vzorky prodloužit nebo zkrátit inkubační dobu primární protilaterky.
17. Protilaterky, v kombinaci s detekčními systémy a příslušenstvím, detekují antigeny, které přeckají běžnou fixaci formalinem, zpracování a rozřezání tkání. Uživatelé, kteří nedodrží doporučené postupy, musejí za těchto okolností přijmout zodpovědnost za interpretaci výsledků pacienta.

Souhrn očekávaných výsledků

Viz následující tabulky reaktivity:

| Běžná studie | | | |
|-------------------|---------------------|--------|----------|
| Tkáň | Počet barvených (+) | Celkem | Poznámky |
| Mozek | 0 | 1 | |
| Kůra nadledvin | 0 | 1 | |
| Vaječník | 0 | 1 | |
| Slinivka | 0 | 2 | |
| Příštítná tělíska | 0 | 1 | |
| Hypofýza | 0 | 1 | |
| Varle | 0 | 1 | |
| Štítná žláza | 0 | 1 | |
| Prso | 0 | 2 | |
| Slezina | 1 | 1 | |
| Mandle | 14 | 14 | |
| Brzlík | 0 | 1 | |
| Kostní dreň | 2 | 2 | |
| Plíce | 0 | 2 | |
| Srdce | 0 | 1 | |
| Jícen | 0 | 1 | |
| Břicho | 0 | 1 | |
| Tenké střevo | 0 | 1 | |
| Tračník | 0 | 1 | |
| Játra | 3 | 10 | |
| Slinná žláza | 0 | 2 | |
| Žlučník | 0 | 1 | |
| Ledviny | 0 | 1 | |
| Močový měchýř | 0 | 1 | |
| Prostata | 0 | 2 | |
| Děloha | 0 | 2 | |
| Vejcovod | 0 | 1 | |
| Močovod | 0 | 1 | |
| Čípek | 0 | 1 | |
| Kosterní sval | 0 | 1 | |
| Hladký sval | 1 | 2 | |

| Běžná studie | | | |
|---------------------|---------------------|--------|----------|
| Tkání | Počet barvených (+) | Celkem | Poznámky |
| Kůže | 0 | 3 | |
| Periferní nerv | 0 | 1 | |
| Mesothelium | 0 | 1 | |
| Tuk | 0 | 1 | |
| Placenta | 5 | 6 | |

Tato protilátká barví normální tkáně, jak je uvedeno ve zveřejněné literatuře.

| Studie postižené tkáně | | | |
|----------------------------------|---------------------|--------|----------|
| Tkání | Počet barvených (+) | Celkem | Poznámky |
| Kaposiho sarkom | 5 | 5 | |
| Hemangiom | 4 | 4 | |
| Hemangioendoteliom | 2 | 2 | |
| Angiosarkom | 1 | 1 | |
| Hemangioblastom | 1 | 1 | |
| Invazivní duktální karcinom prsu | 0 | 19 | |
| Kolorektální karcinom | 0 | 22 | |
| Dermatofibrom | 0 | 1 | |
| Melanom | 0 | 1 | |
| Renální karcinom | 0 | 1 | |
| Dlaždicobuněčný karcinom kůže | 0 | 2 | |

Tato protilátká barví nádory, jak je uvedeno ve zveřejněné literatuře.

Řešení problémů

- Pokud pozitivní kontrola ukáže slabší zbarvení, než očekávané, je třeba během stejného cyklu barvení zkontolovat další pozitivní kontrolní vzorky, aby se dalo stanovit, zda je to způsobeno primární protilátkou nebo některým z běžných sekundárních antigenů.
- Jestliže je pozitivní kontrola negativní, je třeba zkontolovat další pozitivní kontrolní vzorky použité ve stejném cyklu, aby se dalo stanovit, zda základní příčina souvisí s primární protilátkou nebo některým z běžných sekundárních antigenů. Sběr, fixace nebo odstraňování parafínů z tkání mohlo být provedeno nesprávným způsobem. Sběr tkáně, její fixace a skladování musí probíhat ve správném postupu.
- Dojde-li k nadměrnému zbarvení pozadí, mohou být přítomné vysoké hladiny endogenního biotinu. Měl by být zahrnut i krok blokování biotinu, pokud není používán detekční systém bez biotinu; v takovém případě by přítomný biotin nepřispíval k zbarvení pozadí.

- Pokud není veškerý parafin odstraněn, je třeba proces odstranění parafínu opakovat.
- Pokud se tkáňový řez spláchné ze sklíčka, je třeba sklíčka zkontolovat zda jsou kladně nabité. Mezi další možnosti, které by mohly neprávně ovlivňovat adhezi tkáně, patří nedostatečné vysušení tkáňového řezu na krycím sklíčku před barvením nebo fixace ve formalinu, který nebyl vhodně neutrálně urovnaný. Tloušťka tkáně může být rovněž přispívající faktor.

Nápravná opatření naleznete v části Pokyny k použití nebo kontaktujte technickou podporu společnosti Cell Marque na adresu techsupport@cellmarque.com.

Literatura

- Parums DV, et al. JC70: a new monoclonal antibody that detects vascular endothelium associated antigen on routinely processed tissue sections. *J Clin Pathol.* 1990; 43:752-7.
- Attanoos RL, et al. Malignant vascular tumors of the pleura in "asbestos" workers and endothelial differentiation in malignant mesothelioma. *Thorax.* 2000; 55:860-3.
- Alexander-Seref F, et al. Detection of tumour lymphovascular space invasion using dual cytokeratin and CD31 immunohistochemistry. *J Clin Pathol.* 2003; 56:786-8.
- Ortiz-Hidalgo C, et al. CD31 with strong membrane-based immunoreactivity in ductal carcinoma of the breast. *Appl Immunohistochem Mol Morphol.* 2000; 8: 334-5.
- McKenney JK, et al. CD 31 expression in intratumoral macrophages: a potential diagnostic pitfall. *Am J of Surg Pathol.* 2001; 25:1167-73.

Odmítnutí odpovědnosti

*TWEEN je registrovaná ochranná známka společnosti Croda International PLC.

©2017 Sigma-Aldrich Co. LLC. Všechna práva vyhrazena. SIGMA-ALDRICH je ochranná známka společnosti Sigma-Aldrich Co. LLC registrovaná v USA a dalších zemích. Cell Marque, Trilogy, Declere a HiDef Detection jsou ochranné známky společnosti Sigma-Aldrich Co. LLC nebo jejich přidružených společností.

 www.cellmarque.com

 6600 Sierra College Blvd. • Rocklin, CA 95677 USA • 916-746-8900

  EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands



CM Template #2.4
Implementation date 13 Nov 2017